




Traumatismes laryngés : Place primordiale de l'imagerie dans la prise en charge

PATHOLOGIE TRAUMATIQUE

En imagerie

Radiographie standard:

Lésions rachidiennes

Emphysème cervical, signant la rupture de la filière aérique

Scanner : +++ permet de visualiser




- Les traits de fractures cartilagineux, d'autant mieux visibles que les cartilages sont ossifiés
- Les zones de désinsertion
- Simples lésions de contusion
- Emphysème

Scanner :

- Emphysème cervical
- Fracture de l'os hyoïde, des cartilages thyroïde et cricoïde
- Disjonction cricotrachéale,
- Désinsertion du pied de l'épiglotte
- Luxation cricoarythénoïdienne: déplacement médial de l'aryténoïde et aspect bombant de la corde vocale
- Désinsertion de la membrane cricothyroïdienne: un déplacement postérieur du cartilage cricoïde par rapport au cartilage thyroïde, pouvant être associée à une lésion récurrentielle directe
- Modification des espaces paraglottiques: hématome ou œdème massif
- Désinsertion laryngo-trachéale

PATHOLOGIE TRAUMATIQUE

Emphysème et désinsertion laryngo-trachéale



Emphysème cervical post-traumatique, avec décollement de l'espace rétropharyngé secondaire à une désinsertion laryngo-trachéale





Fracture postéro latérale droite du cartilage cricoïde