



Intérêt de l'étude de la perfusion myocardique statique au repos en coroscanner

Ines baya, Ahmed Azzouz, Henda Nèji, Bennour Emna*, Bousnina Mouna, Kchaou Salma,
Baccouche Ines, Lamjed Oueslati, Zeineb Salhi, Saoussen Hantous-Zannad**

Service d'imagerie médicale, Hôpital Abderrahmen Mami Ariana, Tunisie



***Service de cardiologie, Hôpital Abderrahmen Mami Ariana, Tunisie**

****Service de chirurgie cardiovasculaire , Hôpital Abderrahmen Mami Ariana, Tunisie**



Coroscanner en reconstruction curviligne de l'IVA montrant une plaque mixte de l'IVA responsable d'une sténose significative de plus de 70%.


Cartographie de perfusion statique au repos montrant une anomalie de perfusion sous endocardique du territoire antérieur.



Reconstruction curviligne de la Cx montrant une plaque hypodense circonférentielle courte responsable d'une sténose de plus de 70%.

Reconstruction curviligne de l'IVA montrant une plaque hypodense circonférentielle responsable d'une sténose de plus de 70%.

La cartographie perfusionnelle montre des anomalies de la perfusion des territoires antérieur et latéral.



A: Reconstruction curviligne de la CD artéfacté non interprétable sur les différentes phases.
B : Cartographie de la perfusion myocardique statique au repos montrant une anomalie perfusionnelle du territoire inférieur faisant suspecter une sténose de la CD.