


Conflit antero medial

Il est plus rare.

Traumatisme en supination (inversion), en pronation (éversion).

- Le syndrome résulte de microtraumatismes répétés entraînant la formation:
- d'éperons antéro-internes




Conflit antero-medial

Il est plus rare.

Traumatisme en supination (inversion), en pronation (éversion).

- Le syndrome résulte de microtraumatismes répétés entraînant la formation:
- d'épaississement des fibres antérieures du ligament deltoïde ;



Pathologie du tendon d'Achille

- **Paraténonite** : inflammation du **paraténon** en avant du tendon, **tendon normal**
= péricarite, para tendinite, péri tendinopathie.
touche principalement les coureurs

Tendon normal

1



Tenosynovite

2





Tendinose

3




Rupture Tendinaise

4



le conflit postéro médial



(a) Épaississement hypoéchogène du ligament collatéral médial (flèche) avec irrégularités de la corticale de la malléole médiale, avulsions osseuses (têtes de flèches) et hyperhémie en mode Doppler. **(b)**, **(c)** Ossification séquellaire (flèche) d'une avulsion du ligament collatéral médial. MM : malléole médiale.

le conflit postéro médial

Traumatisme en **flexion plantaire, en inversion et en rotation interne.**

== lésions du PTTL et une synovite associée, qui peut envelopper partiellement: le tendon du tibialis postérieur (PTT) (40 % des cas), le tendon du flexor hallucis longus (16 % des cas) ou le tendon du flexor digitorum longus (8 % des cas).

== hypertrophie et fibrose de la capsule tibio-totale postéro-interne et des fibres deltoïdes postérieures.

