


Tableau 1.  
Score radiologique de Pettersson.

| Type de modification                       | Degré d'atteinte | Score |
|--------------------------------------------|------------------|-------|
| Raréfaction osseuse                        | Absente          | 0     |
|                                            | Présente         | 1     |
| Élargissement épiphysaire                  | Absente          | 0     |
|                                            | Présente         | 1     |
| Irrégularités des surfaces sous-chondrales | Absente          | 0     |
|                                            | Présente         | 1     |
|                                            | Importante       | 2     |
| Pincement de l'interligne articulaire      | Absente          | 0     |
|                                            | < 50 %           | 1     |
|                                            | ≥ 50 %           | 2     |
| Kyste sous-chondral                        | Absente          | 0     |
|                                            | Unique           | 1     |
|                                            | Multiple         | 2     |
| Érosion marginale                          | Absente          | 0     |
|                                            | Présente         | 1     |
| Incongruence articulaire                   | Absente          | 0     |
|                                            | Légère ≤ 10°     | 1     |
|                                            | Importante > 10° | 2     |
| Déformation articulaire                    | Absente          | 0     |
|                                            | Légère ≤ 10°     | 1     |
|                                            | Importante > 10° | 2     |

## Arthropathie hémophilique du genou

Pincement artriculaire diffus, érosions marginales et volumineuses géodes sous-chondrales.



## Arthropathie hémophilique du coude

Pincement des deux compartiments articulaires.  
Géodes sous-chondrales avec élargissement de la fossette olécrânienne.



## Arthropathie hémophilique du genou

Coupe échographique longitudinale du récessus sous-quadricipital du genou.  
Hémarthrose de moins de 24 heures avec épanchement homogène, hyperéchogène.




Tableau 4.  
Score IPSG (International Prophylaxis Study Group) en IRM.

| Type d'anomalie            | Degré d'atteinte                                                                       | Score |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Épanchement/hémarthrose    | Faible                                                                                 | 1     |
|                            | Modéré                                                                                 | 2     |
|                            | Important                                                                              | 3     |
| Synovite                   | Faible                                                                                 | 1     |
|                            | Modérée                                                                                | 2     |
|                            | Importante                                                                             | 3     |
| Dépôts d'hémosidérine      | Faibles                                                                                | 1     |
|                            | Modérés                                                                                | 2     |
|                            | Importants                                                                             | 3     |
| Anomalies sous-chondrales  | Au moins une érosion osseuse de surface                                                | 1     |
|                            | La moitié ou plus d'une surface articulaire                                            | 1     |
|                            | Au moins un kyste sous-chondral                                                        | 1     |
|                            | Kystes sous-chondraux d'au moins deux os ou de plus du tiers d'une surface articulaire | 1     |
| Amincissement du cartilage | Au moins une anomalie cartilagineuse                                                   | 1     |
|                            | Perte d'au moins la moitié du volume cartilagineux total                               | 1     |
|                            | Perte totale de cartilage, focale                                                      | 1     |
|                            | Perte totale de cartilage d'au moins la moitié d'une surface articulaire               | 1     |
| Score total                |                                                                                        | 17    |