


COMPARTIMENT MÉDIAL :

Lésion ostéocondrale du talus :



Ces lésions peuvent être rencontrées lors des entorses de cheville. On distingue **deux types principaux**.


1. Lésions de cisaillement

- Présence d'un **trait oblique orienté en bas et en dehors**.
- Siège typique :
 - **Tiers supéro-latéral du dôme talien** lors des mécanismes en **valgus**.
 - **Tiers supéro-médial du dôme talien** lors des mécanismes en **varus**.
- Une **géode associée** peut être présente.

2. Lacune osseuse sous-chondrale





- Aspect de **lacune osseuse sous-chondrale entourée d'un liseré d'ostéosclérose**.
- Localisation typique : **tiers médial du dôme talien**.
- Les **lésions cartilagineuses** sont généralement minimales.
- Peut être **difficile à différencier d'une ostéocondrite séquellaire**.

⚠ **Diagnostic important à dépister, car ces lésions peuvent être athérogènes**



COMPARTIMENT LATERAL :

Ténosynovite des fibulaires :





- Primitive :
 - Inflammatoire (PR, SPA).
 - Mécanique : trochlée fibulaire+++
- Secondaire :
 - Atteinte tendineuse : rupture, fissuration, ou instabilité

COMPARTIMENT ANTÉRIEUR :

Conflit antérieur :






- **Micro traumatique**
 - **Flexion dorsale répétée.**
 - Dû à la compression des parties molles entre le talus et tibia.
 - Formation éperons osseux antérieurs en miroir.
- **Sports favorisants** : football+++ et danse



COMPARTIMENT POSTÉRIEUR :

Conflit Postérieur :



- Micro traumatique :

- Dû à la compression des parties molles entre la malléole tibiale

Postérieure et le calcaneum

- Œdème des parties molles.
- Œdème du processus postérieur du talus.
- Œdème de la malléole tibiale postérieure.

- Facteurs favorisants:

- Sport : flexion plantaire
- Facteurs anatomiques
 - Processus postérieur talus.
 - Os Trigone.
 - Muscle Soléaire accessoire