



ANATOMIE DES NERFS EN IRM



Coupes CISS axiales

Reconstruction coronale oblique :
Coupe des 4 nerfs

BOUCLE VASCULAIRE : N.VII




Patiente de 36 ans, présente des céphalées diffuses.

Boucle vasculaire entre l'AICA et le paquet acoustico-facial bilatéralement ,
réalisant un contact avec empreinte sur ce dernier, retrouvée à 5,6 mm de la REZ
dans sa portion cisternale.

Absence de concordance clinique → Pas de conflit

ELIMINER LES DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS




Coupes axiales

Coupe sagittale

- Patiente de 56 ans, présentant une hypoesthésie dans le territoire du trijumeau gauche depuis 2 ans.
 - Processus lésionnel tissulaire extra-axial paramédian gauche, à large base d'implantation sur la face postérieure du clivus avec hyperostose, s'étendant vers le cavum de Meckel gauche, réalisant un effet de masse sur la portion cisternale du nerf trijumeau, et s'étendant à la berge antérieure du porus du CAI gauche, refoulant le paquet acoustico-facial, rehaussé après injection de Gadolinium
- Méningiome de l'APC

BOUCLE VASCULAIRE : N.V



Coupes axiales

Coupe coronale

Patiente de 27 ans, présente des douleurs temporales droites avec dysesthésies pulsatiles de la joue droite et vertiges.

Boucle vasculaire entre l'ACS et le N.trijumeau gauche, réalisant un contact avec empreinte, à 6 mm de la REZ dans sa portion cisternale.

Absence de concordance clinique → Pas de conflit