



ADC 2.0 R 1.66


1100
1000
900
800
700
600
500
475.0
0
422.9
0
100000
200000
300000
1
1
1
1022/1

1

Adénome pléomorphe (tumeur mixte)

- 50 à 60 % des tumeurs parotidiennes bénignes
- Double composante cellulaire / conjonctive myxoïde
- Solitaire, indolore, d'évolution lente
- Siège superficielle (90 %)



Louisa Lu MD, Pleomorphic Adenoma, 2021

- Échographique : hypoéchogène **homogène**, contours **bosselés**, renforcement postérieur. Vascularisation **modérée** (Doppler) ≠ kyste, ± calcifications.

Bialek EJ,. US of the major salivary glands : anatomy and spatial relationships, pathologic conditions, and pitfalls. Radiographics 2006

IRM

- Contours **lobulés**, **franc hypersignal T2 homogène** (stroma fibromyxoïde) majoré sur les séquences avec suppression de graisse.
- Hyposignal T1 non spécifique
- **ADC élevé** (stroma fibromyxoïde prédominant), ADC tumeur/parotide normale > 1,2
- **Rehaussement progressif** avec un pic retardé > 120 s et un lavage faible < 10% à 5 minutes (type A)



Halimi P. Les tumeurs des glandes salivaires. Cancer Radiothérapie 2005