



Guide interactif d'une lésion splénique



L'organe oublié de la cavité abdominale

PATHOLOGIES SPLÉNIQUES SPÉCIFIQUES

Lésions kystiques




Lésions solides



Cas particuliers




PATHOLOGIES SPLÉNIQUES SPÉCIFIQUES





Lésions kystiques





LÉSIONS SPLÉNIQUES KYSTIQUES À CONTENU ANÉCHOGÈNE

Kyste hydatique

Kyste splénique parasitaire le plus fréquent

Echinococcus granulosus

Retour de zone d'endémie : **1^{er} diagnostic à retenir**

3e site par ordre de fréquence (Foie > poumon > **rate**)


Contenu différent en fonction du stade (Gharbi)

Eau

Membranes flottantes

Vésicules filles (petit kyste dans le kyste)


Souvent **associé** à l'atteinte hépatique





Lésions kystiques

A contenu épais +/- paroi



LÉSIONS SPLÉNIQUES KYSTIQUES À CONTENU ECHOGENE +/- PAROI



Kyste épidermoïde

Rare (0,1%)


Femme jeune, asymptomatique (en fonction de la taille)

Epithélium pluristratifié qui **desquame**

Complications : hémorragie intrakystique, surinfection, rupture

Echographie

Aspect festonné, mobile aux mouvements






LÉSIONS SPLÉNIQUES KYSTIQUES À CONTENU ECHOGENE +/- PAROI

Kyste épidermoïde


TDM

Densité variable
Calcifications possibles



IRM

T1 variable





Lésions solides

Bénigne et unique



LESION SOLIDE BENIGNE UNIQUE

Angiome

Tumeur bénigne la plus fréquente de la rate (14% des séries autopsiques)

ECHOGRAPHIE


Angiome caverneux

Hypoéchogène avec des plages kystiques
Complètement kystique

Angiome capillaire

Iso ou hyperéchogène
Rond avec des limites nettes

Structures vasculaires périphériques ou centrales
Compressible sous la sonde



LESION SOLIDE BENIGNE UNIQUE

Angiome

IRM

Nodule vasculaire homogène

Rehaussement centripète inconstant

HyperT2 marqué (moins que dans le foie)

T1 variable (sang, contenu protéique)

Prise de contraste périphérique continue possible



Foie

